

5 . DeVIC療法

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン(注)	33mg/body	■	■	■																		
エトポシド	100mg/m ²	■	■	■																		
イホスファミド	1500mg/m ²	■	■	■																		
メスナ	300mg/m ² /回×3	■	■	■																		
カルボプラチン	300mg/m ²	■																				

6 . ABVd療法

インターバル:4週

総コース数:最大8コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ビンブラスチン※1	6mg/m ²	■														■													
ドキソルビシン	25mg/m ²	■														■													
ブレオマイシン※2	9mg/m ²	■														■													
ダカルバジン	250mg/m ²	■														■													
※1ビンブラスチンの上限は10mg																													
※2ブレオマイシンの上限は15mg																													

7 . GDP療法【Modify】(変法有り)

インターバル:3~4週

総コース数:4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デキサメタゾン(注)	33mg/body	■	■	■	■																								
ゲムシタビン	1000mg/m ²	■							■																				
シスプラチン	75mg/m ²	■																											

8 . GEM

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン	1000mg/m ²	■							■							■													

9 . 大量MTX + LV救援療法

インターバル:2週以上

総コース数:原則3コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メトトレキサート※	3000~3500mg/m ²	■													
※65歳以上の患者では1000mg/m ² に減量															

10 . Brentuximab Vedotin

インターバル:3週

総コース数:最大16コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

11 . CPT-11(C法)【 4W ・ 5W 】

インターバル:5週(day1.2.3.8.9.10投与の場合は4週)

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
イリノテカン	40mg/m ²	■	■	■					■	■	■					■	■	■																					

12 . Modified R-CODOX-M/IVAC療法(R-CODOX-M)

インターバル:規定なし

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
シクロホスファミド	800mg/m ²	■																					
	200mg/m ²		■	■	■	■																	
ビンクリスチン※1	1.5mg/m ²	■							■							■							
ドキシソルビシン	40mg/m ²	■																					
メトレキサート	536mg/m ²									■													
メトレキサート	2461mg/m ²										■												
ロイコボリン	85.7mg/m ²											■											
ロイコボリン※2	12mg/m ²												■	■	■	■	■						
シタラビン(髄注)※3	40mg/body	■																					
プレドニゾン(髄注)※3	20mg/body	■																					
メトレキサート(髄注)※3	15mg/body																■						
プレドニゾン(髄注)※3	10mg/body																	■					
リツキシマブ※4	375mg/m ²									■													

※1 オンコビンの上限は2mg、Day15は1コース目は実施せず、2コース目で神経障害が無ければ実施□
 ※2 ロイコボリンの12mg/m²はMTX血中濃度が5×10⁻⁸M未満になるまで投与
 ※3 初診時に中枢神経浸潤を認めた症例では1コース目にDay 5 (Ara-C)、Day 17(MTX)を追加。2コース目は実施しない。□
 ※4 リツキサン不要の場合は除く

13 . Modified R-CODOX-M/IVAC療法 (R-IVAC)

インターバル:規定なし

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イホスファミド	1500mg/m ²	■	■	■	■	■									
メスナ	300mg/m ²	■	■	■	■	■									
エトポシド	60mg/m ²	■	■	■	■	■									
キロサイド	2000mg/m ²	■	■	■	■	■									
	2000mg/m ²	■	■	■	■	■									
シタラビン(髄注)※1	40mg/body							■		■					
プレドニゾン(髄注)※1	20mg/body							■		■					
メトレキサート(髄注)	15mg/body					■									
プレドニゾン(髄注)	10mg/body					■									
リツキシマブ※2	375mg/m ²							■							

※1 初診時に中枢神経浸潤を認めた症例では、1コース目に追加。2コース目は実施しない。□
 ※2 リツキサン不要の場合は除く□

14 . CHASE療法

インターバル:3週

総コース数:最大4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
デキサメタゾン(注)	33mg/body	■	■	■																			
シクロホスファミド	1200mg/m ²	■																					
シタラビン	2000mg/m ²	■																					
エトポシド	100mg/m ²	■																					

15 . A+AVD療法

インターバル:4週

総コース数:最大6コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
プレツキシマブ ベドチン	1.2mg/kg	■														■													
ドキシソルビシン	25mg/m ²	■														■													
ビンブラスチン※1	6mg/m ²	■														■													
ダカルバジン	375mg/m ²	■														■													

※1 エクザールの上限は10mg

16 . A+CHP療法

インターバル:3週 総コース数:最大8コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ブレントキシマブ ベドチン	1.8mg/kg	/																					
ドキシソルビシン	50mg/m ²	/																					
シクロホスファミド	750mg/m ²	/																					
プレドニゾン(内服)	60mg/m ²	/	/	/	/	/																	

17 . RB療法

インターバル:4週 総コース数:6コースまで

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
リツキシマブ	375mg/m ²	/	/																										
ベンダムスチン	90mg/m ²	/	/																										

18 . Obinutuzumab 維持療法

インターバル:2ヶ月(9週) 総コース数:最大12コースまで
(インターバル変動するためレジメン上9週間にしている)

薬剤名	投与量	1	2	...	63
オビヌツズマブ	1000mg/body	/	/		