

7 . VTD療法(皮下注)

下記AのDay1、4、8、11投与のインターバル3週で行い、必要時B→C→D→Eと減量

A

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/			/				/			/											
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/			/				/			/											
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

B

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/							/							/							/																
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/							/							/							/																
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

C

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/							/							/																								
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/							/							/																								
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

D

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/							/							/																								
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/							/							/																								
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

E

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/							/														
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/							/														
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

8 . CPA

インターバル:1週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
シクロホスファミド	200~400mg/m ²	/						

9 . KRd療法(レジメン10.11を含む)

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
カルフィルゾミブ※	20mg/m ²	/	/																																					
	27mg/m ²								/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	/							/							/							/																	
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2~12コース目

インターバル:4週

総コース数:11コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
カルフィルゾミブ※	27mg/m ²	/	/						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	/							/							/							/																	
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

13~18コース目

インターバル:4週

総コース数:6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
カルフィルゾミブ※	27mg/m ²	/	/						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	/							/							/							/																	
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

12 . DLd療法(レジメン13.14.15を含む)

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラツムマブ	16mg/kg	■							■							■							■							
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■							■							
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■							■							■							■						
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

2コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	16mg/kg	■							■							■							■						
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■							■						
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■							■							■							■					
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

3~6コース目

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	16mg/kg	■														■													
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■														■													
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■														■												
デキサメタゾン(内服)	40mg/body								■									■							■				
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

7コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	16mg/kg	■																											
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■																											
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■																										
デキサメタゾン(内服)	40mg/body								■								■								■				
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

16 . VRD療法(皮下注)

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■			■				■			■										
デキサメタゾン(内服)※	20~40mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 65歳以上の患者では10~20mg/bodyに減量

17 . VRD療法(静注)・16.VRD療法(皮下注)と同じ

18 . VCD療法(皮下注)

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■							■						
シクロホスファミド(内服)	300mg/m ²	■							■							■							■						
デキサメタゾン(内服)※	40mg/body	■							■							■							■						
ラモセトロン(内服)	0.1mg/body	■							■							■							■						

※ 65歳以上の患者では20mg/bodyに減量

19 . VCD療法(静注)・18.VCD療法(皮下注)と同じ

20 . PVd療法(皮下注)(レジメン21を含む)

1~8コース目

インターバル:3週

総コース数:8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■			■				■			■										
デキサメタゾン(内服)※	20mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

9コース目以降

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■													
デキサメタゾン(内服)※	20mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 76歳以上の患者では10mg/bodyに減量

22 . PVd療法(静注)(レジメン23を含む)・・・20.PVd療法(皮下注)(レジメン21を含む)と同じ

24 Kd療法【Weekly】

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カiproリス※1	20mg/m ²	■																											
	70mg/m ²								■								■												
デキサート※2	10.5~ 33mg/body	■							■								■												
レナデックス(内服)※3	20~40mg/body																												■

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

※2 76歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

※3 76歳以上の患者では20mg/bodyに減量

25 Kd療法【Weekly】

2~9コース目

インターバル:4週

総コース数:8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カiproリス※1	70mg/m ²	■							■							■													
デキサート※2	10.5~ 33mg/body	■							■							■													
レナデックス(内服)※3	20~40mg/body																												■

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

※2 76歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

※3 76歳以上の患者では20mg/bodyに減量

26 Kd療法【Weekly】

10コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カiproリス※1	70mg/m ²	■							■							■													
デキサート※2	10.5~ 33mg/body	■							■							■													

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

※2 76歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

27 EPd療法

1~2コース目

インターバル:4週

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エムプリシティ	10mg/kg	■							■							■								■					
デキサート※1	13.2~29.7mg/body	■							■							■								■					

ポマリスト(内服)	4mg/body																											
-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※1 76歳以上の患者では13.2mg/bodyに減量

28 EPd療法
3コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
エムブリシテ	20mg/kg																													
デキサート※1	13.2~29.7mg/body																													
レナデックス(内服)※2	20~40mg/body																													
ポマリスト(内服)	4mg/body																													

※1 76歳以上の患者では13.2mg/bodyに減量

※2 76歳以上の患者では20mg/bodyに減量

29 VRD-lite療法(皮下注)
1~9コース目

インターバル:5週

総コース数:9コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	...	34	35									
ベルケイド	1.3mg/m ²																																			
レナデックス(内服)※	20~40mg/body																																			
レブラミド(内服)	25mg/body																																			

※ 76歳以上の患者では20mg/bodyに減量

30 VRD-lite療法(皮下注)
10コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ベルケイド	1.3mg/m ²																													
レブラミド(内服)	25mg/body																													

31 DLd療法(皮下注)
1~2コース目

インターバル:4週

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキューロ	1800mg/body																													
デキサート	16.5mg/body																													
レナデックス(内服)※	20mg/body																													
レブラミド(内服)	10~25mg/body																													

※76歳以上又は過少体重(BMI:18.5kg/m²未満)の患者では省略

32 DLd療法(皮下注)
3~6コース目

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラキューロ	1800mg/body																													
デキサート	16.5mg/body																													
レナデックス(内服)※1	20mg/body																													
レナデックス(内服)※2	40mg/body																													
レブラミド(内服)	10~25mg/body																													

※1 76歳以上又は過少体重(BMI:18.5kg/m²未満)の患者では省略

※2 76歳以上又は過少体重(BMI:18.5kg/m²未満)の患者では20mg/bodyに減量

33 DLd療法(皮下注)
7コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラキューロ	1800mg/body	■																											
デキサート	16.5mg/body	■																											
レナデックス(内服)※1	20mg/body		■																										
レナデックス(内服)※2	40mg/body							■									■							■					
レブラミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 76歳以上又は過少体重(BMI:18.5kg/m²未満)の患者では省略

※2 76歳以上又は過少体重(BMI18.5kg/m²未満)の患者では20mg/bodyに減量

34 DPd療法(皮下注)

1~2コース目

インターバル:4週

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラキューロ	1800mg/body	■							■							■							■						
デキサート	16.5mg/body	■							■							■							■						
レナデックス(内服)※	20mg/body		■							■							■							■					
ポマリスト(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※75歳以上の患者では省略

35 DPd療法(皮下注)

3~6コース目

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラキューロ	1800mg/body	■														■													
デキサート	16.5mg/body	■														■													
レナデックス(内服)※1	20mg/body		■														■												
レナデックス(内服)※2	40mg/body								■									■						■					
ポマリスト(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 75歳以上の患者では省略

※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量

36 DPd療法(皮下注)

7コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラキューロ	1800mg/body	■																											
デキサート	16.5mg/body	■																											
レナデックス(内服)※1	20mg/body		■																										
レナデックス(内服)※2	40mg/body								■								■							■					
ポマリスト(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 75歳以上の患者では省略

※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量

37 IsaKd療法

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	10mg/kg	■							■							■							■						
カイプロリス※	20mg/m ²	■	■																										
	56mg/m ²								■	■						■	■												
デキサート	16.5mg/body	■	■						■	■						■	■						■						
レナデックス(内服)	20mg/body																							■					

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

38 IsaKd療法
2コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	10mg/kg	/																											
カイトロリス※	56mg/m ²	/	/					/	/							/	/												
デキサート	16.5mg/body	/	/					/	/							/	/												
レナデックス(内服)	20mg/body																						/	/					

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

39 IsaPd療法
1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	10mg/kg	/						/	/							/	/						/	/					
デキサート※	33mg/body	/						/	/							/	/						/	/					
ポマリスト(内服)	4mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

※75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

40 IsaPd療法
2コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	10mg/kg	/																											
デキサート※1	33mg/body	/						/	/							/	/												
ポマリスト(内服)	4mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
レナデックス(内服)※2	40mg/body							/	/														/	/					

※1 75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量

41 Isa+d療法
1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	20mg/kg	/						/	/							/	/						/	/					
デキサート※	33mg/body	/						/	/							/	/						/	/					

※75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

42 Isa+d療法
2コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	20mg/kg	/																											
デキサート※1	33mg/body	/						/	/							/	/												
レナデックス(内服)※2	40mg/body							/	/														/	/					

※1 75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量