泌尿器科レジメン

1 . GEM

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | |

2 . DTX

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドセタキセル | 75mg/㎡ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 . GEM+CDDP 《入院》

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン | 70mg/㎡ | | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4 . GEM+CBDCA

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | ／ | | | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン | AUC=4～5 | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒投与量mg/body ＝ AUC×（GFR＋25） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 . PE療法 《入院》

インターバル：3～4週　　総コース数：4コース

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エトポシド | 100mg/㎡ | ／ | ／ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン | 80mg/㎡ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6 . CBZ+PSL（内服）

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバジタキセル | 25mg/㎡ | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレドニゾロン（内服） | 10mg/day | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |

7 . Pembrolizumab

インターバル：3週　　総コース数：進行再発⇒規定なし
術後補助⇒12ヶ月まで
（総コース数：最大17コース）

| 薬剤名 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | ／ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |